

Radi-K Tab.

編號：15

【主成分】Potassium Gluconate 595mg/錠

【商品名】Radi-K Tab. 595mg/錠

【中文商品名】鉀順錠

【作用】

用於治療或預防低血鉀。

【用法】

因個人狀況不同，故所需服用之劑量、頻次、期間亦有所差異，請遵照醫師處方之劑量及用法使用，未經醫師指示，切勿自行驟然更改劑量。

【注意事項】

1. 服藥時應坐直，在飯間或飯後配合開水整粒吞服。請勿咬碎或壓碎服用。若偶而在排出的糞便中發現像藥物錠核的東西，請勿擔心，裡面已經不含任何的鉀。
2. 若您有嚴重之腎臟疾病、胃腸道阻塞疾病，就診時請務必告知醫師。
3. 若您計畫懷孕或已經懷孕，請詢問你的醫師是否可服用此藥物。
4. 曾對本藥物或鉀製劑過敏者，請務必告知醫師。
5. 當您服用有其他下列藥物如Apo-Capto(安保康)、Captolin(可平壓)、spirotone(蘇拉通)或其他含鉀之製劑時，請務必告知您的醫師，以便調整您使用本藥物的劑量。
6. 服用本藥期間切勿攝食過量含高鉀之食物，例如：香蕉、楊桃、生肉....等等。
7. 不可將本藥與他人分享，以免發生危險。

【副作用】

1. 若您於服藥期間發生下列狀況：意識混亂；心跳不規則；手腳麻木；極度虛弱；呼吸困難；嚴重胃痛或嘔吐；胸痛、喉嚨痛；解血便或黑便時請立即回診就醫。
2. 若您於服藥期間持續發生下列狀況：輕微噁心、絞痛、胃部不適、腹瀉時請於回診時主動告知醫師。

【忘記服藥怎麼辦？】

忘記服藥，則請盡快補服。倘若已接近下次的服藥時間，則請待下次正確之服藥時間再服藥。請注意：切勿在同一時間內重複服用兩次劑量!!

此教育單張並未包含本藥所有的資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。諮詢電話 06-3125101 轉 1203
高雄榮民總醫院臺南分院藥劑科製