

國內疫情

106/04/15~106/04/30

資料來源：衛生福利部疾病管制署

- ◎ 疾管署與麥當勞叔叔之家慈善基金會攜手前進校園「一起洗手趣」，教導學童落實正確勤洗手，預防腸病毒(2017-04-28)
- ◎ 防範腸病毒威脅小寶貝健康，家長及教托育人員應提高警覺，加強個人衛生，如發現嬰幼兒有重症前兆病徵請儘速送醫(2017-04-18)

依據疫情監測資料統計，上週（4月16日至22日）全國門、急診腸病毒就診人次共計3,139人次，尚處於低點。病毒監測資料顯示，今年截至4月27日，國內共檢出14例腸病毒71型散發個案，顯示社區中仍有腸病毒71型活動，惟個案均為輕症；今年累計1例腸病毒併發重症病例，感染克沙奇A2型，去年累計33例重症病例。

疾管署表示，正確的洗手是預防傳染病最有效的方法之一，隨著氣溫逐漸升高，腸病毒疫情將隨之升溫，民眾應養成良好個人衛生習慣，把握正確洗手五時機－「吃東西前跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，並確實做到洗手五步驟－「濕、搓、沖、捧、擦」，以降低腸病毒等傳染病等傳播風險。

由於腸病毒重症病程發展快速，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息，不要上學或帶至安親班，以降低交叉感染的機會，並請家長留意嬰幼兒是否出現嗜睡意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。一旦出現上述病徵，請儘速送往醫院接受治療。

- ◎ ◎ 預防愛滋多管齊下 讓您愛的安全不憂心(2017-04-25)

疾管署提醒，落實安全性行為及相關防護措施仍是預防感染愛滋病毒最重要的方式，如性行為時全程正確使用保險套，不參加轟趴、性派對或有多重性伴侶、不共用針具、不使用毒品、定期篩檢等。符合PrEP使用資格者，只要依醫囑按規服藥及配合上述預防措施，並每3個月定期做愛滋篩檢，即可達預防感染愛滋的最大效果。

- ◎ ◎ 5月1日起，嬰幼兒第3劑B型肝炎疫苗，暫以六合一疫苗取代；另第4劑五合一疫苗接種時程調回「出生滿18個月」(2017-04-26)

家中有小小孩的家長們注意囉！因應國際B型肝炎疫苗產能不足，疾病管制署宣布，今（106）年5月1日起，出生滿6個月嬰幼兒應接種的第3劑B型肝炎疫苗及五合一疫苗，將暫時以六合一疫苗的形式取代；另針對嬰幼兒第4劑五合一疫苗接種時程，將同步由目前的「出生滿27個月」調回「出生滿18個月」，請家長們務必按時帶小寶貝接種疫苗，以確保健康。