

國內疫情

105/11/16~105/11/30

資料來源：衛生福利部疾病管制署

◎ 「Hands up 舉手為愛滋」 世界愛滋病日挺愛紅爆自由廣場(2016-11-30)

每年12月1日為世界愛滋病日，疾管署表示，目前愛滋防治面臨最大的挑戰，即是社會對愛滋病的汙名與歧視，讓感染者感到孤立，而不願出來篩檢及治療，最後恐因延誤救治而造成不可挽回的遺憾，並強調愛滋防治需透過多元策略，包括性教育、落實安全性行為、去除歧視、藥癮減害、篩檢及治療等，才能有效控制疫情。

◎ 針對高雄國際航空站捕獲漢他病毒陽性錢鼠，疾管署與航站持續進行相關防鼠措施，監控航站鼠隻狀況(2016-11-30)

漢他病毒出血熱由感染漢他病毒引起，為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為齧齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人一旦吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，即可能受到感染。潛伏期數天至兩個月，一般可能會出現的症狀包括發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、不等程度出血現象並侵犯腎臟等。

落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不政策可有效預防感染漢他病毒，民眾平時應留意生活周遭老鼠可能入侵的途徑，注重環境清潔與衛生，並採取相關防鼠滅鼠措施；廚餘或動物飼料應妥為處理，同時清除老鼠可能躲藏的死角，如倉庫、儲藏室等。清理鼠類排泄物時，應先配戴口罩及橡膠手套，並用稀釋漂白水（10公升清水+100cc市售漂白水）或酒精進行噴灑，待消毒作用30分鐘後再行清理，以策安全。

◎ 12月1日起公費流感疫苗開放全民接種至疫苗用罄；另擴大公費流感抗病毒藥劑用藥對象(2016-11-29)

◎ 慢性病患者、孕婦及嬰幼兒感染流感易引發重症，應儘早接種疫苗以獲得足夠保護力(2016-11-28)

疾管署宣布，今(105)年12月1日起公費流感疫苗接種對象將擴大為全國民眾，至疫苗用罄為止，呼籲尚未接種的民眾儘快接種，以提升自身與群體保護力。

另為減少流感疫情對民眾健康的危害，自今年12月1日至明(106)年3月31日，擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增加「家人/同事/同班同學有類流感發病者」。

◎ 目前氣溫仍適合登革熱病媒蚊生長，請民眾持續落實戶內外環境整頓，做好防蚊措施，嚴防疫情發生(2016-11-29)

◎ 國內出現今年入夏後登革熱社區群聚病例，疾管署及環保署促台北市加強防治力道，防範疫情擴散(2016-11-27)

今(105)年入夏以來台北市發生首起本土登革熱社區群聚事件，社區健康監測將持續至12月中下旬，該起疫情推測與境外移入病例有關。疾管署呼籲，台北市居住於內湖區瑞光里的民眾務必注意自身健康狀況，如出現登革熱疑似症狀應儘速就醫並告知相關活動史，同時做好防蚊措施，避免被蚊蟲再次叮咬造成疫情擴散；此外，請民眾持續戶內外積水容器清除，以完全阻斷疫情傳播。

- ◎ **106年起針對1歲以下(含)幼兒應接種之常規疫苗劑次，補助合約院所每診次100元預防接種處置費(2016-11-24)**
- ◎ **近期諾羅病毒群聚感染疫情頻傳，呼籲學校、餐飲業加強防治，並留意個人及環境衛生(2016-11-22)**

目前已進入諾羅病毒等病毒性腸胃炎的好發季節，提醒民眾應注意個人及飲食衛生，學校及餐飲業應加強管理防治，以防範疫情發生。諾羅病毒群聚事件常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好之衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，常造成大規模群聚事件發生。

此外，人與人之間的接觸也是諾羅病毒的傳播管道，因此民眾在烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件、病患應在家休息至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，降低病原藉由人與人接觸而增加傳播風險；若無法請假，也應請其配戴口罩，避免接觸傳染，並注意經常且正確洗手、避免以手碰觸口鼻等衛生習慣，是預防諾羅病毒最重要的措施。

- ◎ **沙烏地阿拉伯 MERS 疫情仍未歇，提醒民眾前往流行地區提高警覺 (2016-11-16)**

沙烏地阿拉伯於10月15日至29日期間向世界衛生組織(WHO)通報13例中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)，其中有4例死亡，另還包括該國東部胡富夫市(Hofouf)的一起醫院群聚疫情；鑒於中東地區全年均有散發病例發生風險，提醒國人赴當地旅遊時，應注意個人衛生及手部清潔，並避免接觸駱駝及生飲駱駝奶等製品，如非必要應避免至當地醫療院所，以降低感染風險。