

# 國內疫情

105/12/01~105/12/15

資料來源：衛生福利部疾病管制署

## ◎ 今年入冬第一波冷氣團南下，民眾請提高警覺，並注意流感重症徵兆(2016-12-13)

本流感季（今年7月1日起）迄今累計205例流感併發重症個案，9成以上為50歲以上成人，其中93%有慢性病史，89%未接種流感疫苗。205例重症個案中有24例死亡個案經審查與流感相關，71%死亡病例感染H3N2，92%病例有慢性病史，83%未接種流疫苗。目前國內檢出之流感病毒以H3N2為主，監測資料顯示98% H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，未發現抗藥性病毒株。今年度公費流感疫苗自10月1日開打至12月11日止，接種數已超過581萬劑，整體疫苗使用率已逾96%，由於部分縣市合約院所已陸續出現疫苗用罄情形，建議民眾前往接種前可先以電話詢問，避免白跑一趟。

## ◎ 疾管署重申，預防感染A型肝炎最有效方法是接種疫苗、避免接觸受病毒污染的食物與水以及避免不安全性接觸(2016-12-11)

A型肝炎是主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑，包括食用、飲用受病毒污染的食物、與A肝感染者密切接觸，例如：共同飲食及親密接觸(性接觸)造成感染等。而A型肝炎的預防，可透過接種A肝疫苗達到預防感染之目的，是最為有效的防治措施，一般接種1劑疫苗後，約有95%以上的民眾可產生保護抗體，而按期完成兩劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。一旦得到A型肝炎也只要經由醫師診治，提供適當藥物治療，大部分的人均可完全康復。

## ◎ 疾管署持續掌握國內外禽流感疫情，請民眾落實不接觸、不生食；禽場人員加強自我防護(2016-12-06)

依據世界動物衛生組織(OIE)公布資料顯示，今(2016)年下半年起，全球發生多起H5及H7各亞型別高/低病原性禽流感疫情，其中近期亞洲、歐洲及中東發生H5N8高病原性禽流感疫情，另鄰近之韓國、日本亦發生H5N6高病原性禽流感疫情，野鳥及養禽場持續檢出病毒。針對國內養禽場發生禽類禽流感疫情，將持續督導地方政府衛生局依「動物流感疫情人員防治指引」之標準作業程序，密切監測發生禽流感疫情之禽場人員及執行撲殺/清場作業相關工作人員健康情形，並要求相關人員自主健康管理10天，一旦出現急性呼吸道感染症狀，必須立即戴上口罩，主動通報地方衛生局(所)，以協助就醫。凡是經醫師評估有感染風險的執行感染禽場撲殺、清場作業人員，將立即提供抗病毒藥劑。今年截至12月2日，撲殺、清場作業相關人員之健康監測共監測約11,035人日，皆未發現有人類病例。

## ◎ 疾管署持續掌握國內外禽流感疫情，請民眾落實不接觸、不生食；禽場人員加強自我防護(2016-12-06)

今年迄12月5日累計29例(含1例死亡)，其中23例感染腸病毒71型、2例感染感染克沙奇A4型、餘4例分別感染克沙奇A5型、A6型、B3型病毒與伊科18型病毒。目前社區主要流行病毒為克沙奇A型，截至目前共檢出165例腸病毒71型散發個案(141例輕症、1例疑似重症、23例重症)；另近期香港及日本腸病毒疫情均處於高點。疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，容易於家庭及教托育機構內傳播，教托育機構應定期進行環境消毒，大人工作返家抱小孩前務必更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，如帶家中幼童外出，幼童返家或進食前亦需確實用肥皂洗手以避免感染腸病毒。

## ◎ 中東地區持續發生MERS疫情，元旦連假將至，民眾如赴該地區請提高警覺(2016-12-13)

## ◎ 中國大陸廣西壯族自治區出現H5N6流感病例，該區旅遊疫情建議提升至第二級警示(Alert)(2016-12-02)