

# 國內疫情

107/04/16~107/04/30

資料來源：衛生福利部疾病管制署

## ◎ 今日新增 1 例麻疹確定病例，籲請接觸者落實自主健康管理，有疑似症狀戴口罩速就醫(2018-04-27)

病管制署公布國內新增 1 例麻疹確定病例，為北部 20 多歲男性，近期無出國史，4 月 22 日因肢體出疹就醫，經醫院採檢通報於今（27）日確診，目前居家隔離中。該個案與疾管署 4 月 5 日公布之北部 40 多歲女性病例確診前可傳染期間有暴露，研判可能為該個案所感染。疾管署表示，個案於發病當日即赴醫院就診，於急診發燒篩檢站立刻被高度懷疑麻疹並分流轉至負壓病房，避免暴露其他醫護人員及病患；此外，個案也主動提及之前活動史協助診治通報，是感控成功的案例。

## ◎ 為因應 MMR 疫苗需求量遽增，疾管署呼籲讓高風險族群優先接種(2018-04-23)

疾病管制署於今（23）日邀集傳染病防治諮詢會預防接種組專家，針對目前麻疹疫情及自費疫苗供貨情形進行討論。由於我國 MMR 疫苗第二劑完成率高達 97% 以上，群體保護力佳，會中專家一致建議疫苗應優先提供 1981 年（含）以後出生之成人中，並以下列二大族群為最優先接種對象，後續視疫苗供應狀況再適時調整：

- 一、 臺北市、新北市及桃園市之醫學中心急診室醫護人員。
- 二、 桃園國際機場機組人員。

## ◎ 國內新增 1 例傷寒境外移入確定病例，呼籲出國民眾切勿生食生飲(2018-04-17)

為北部 20 餘歲女性，3 月 8 日至 27 日間曾前往印度新德里出差，個案於當地斷斷續續出現上吐下瀉及發燒症狀但未就醫，返國後於 3 月 28 日至急診就醫，經 4 月 13 日通報並檢驗確診為感染傷寒。衛生單位於調查時發現個案在印度出差期間曾食用生魚片及生蝦，其同行友人亦於旅程中出現腹瀉症狀，現已安排採檢糞便送驗，其餘相關接觸者刻正調查中。感染國家以印尼 7 例為最多，其餘為鄰近亞洲國家。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約 8 至 14 天（可由 3~60 天不等），主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。預防傷寒的方法包括：食物充分煮熟並以熟食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑澈底洗手，才能有效防範。