

國內疫情

107/08/01~107/08/15

◎ 七夕要愛也要篩，健康 Check Together ! (2018-08-14)

今(2018)年截至7月底，我國愛滋新增通報感染人數為1,156人，較去年同期減少401人，降幅達26%，其中15歲至24歲及25歲至34歲新增通報的感染者各占294人及526人。

每年農曆七月七日七夕情人節，在這天有祈求或祭拜牛郎織女的習俗，也成為現代人告白或情侶約會的重要節日。提醒所有的型男美女們，為了預防愛滋和其他性病，應避免多重性伴侶和不安全性行為，遠離毒品，也別忘記利用匿名篩檢及性行為戴套(安全性行為)，做好保護自己和愛人的重要準備。

提醒曾有不安全性行為的朋友，至少要做一次愛滋和性病篩檢，如果持續有多重性伴侶，或是經常注射或吸食毒品者，則建議每3至6個月篩檢一次。篩檢服務網址：

<https://goo.gl/pLLhMr>。另為鼓勵大家響應愛滋篩檢，自今年7月10日至9月30日推廣一起去篩檢活動，活動期間共167處篩檢點，提供民眾愛滋病毒快速篩檢服務，活動詳情請見網址：<https://checktogether.cdc.gov.tw>。

◎ 新北市新莊區新增1例本土登革熱病例，與上週個案屬同一波疫情，提醒民眾雨後應加強戶內外環境整頓與積水容器清除 (2018-08-14)

今(2018)年截至8月13日國內共計14例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市10例、臺北市2例、高雄市及嘉義縣各1例。疾管署公布國內新增1例本土登革熱病例，新北市新莊區海山里20多歲女性，近期無國外旅遊史，8月5日出現發燒、全身肌肉痠痛等症狀並就醫，8月10日診所登革熱NS1抗原快速診斷陽性並通報，經確診登革熱。

登革熱NS1抗原快速診斷試劑20至30分鐘內即可完成登革病毒檢驗，提醒民眾一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀應立即就醫；醫療院所如遇疑似登革熱症狀的病人，應使用登革熱NS1抗原快速診斷試劑輔助診斷，以利及早診斷通報與執行防疫工作，降低疫情傳播的風險。

近期國內各地有局部短暫陣雨或雷雨，民眾雨後應加強戶內外環境整頓，務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置。

◎ 嘉義縣確診1例本土登革熱病例，籲請民眾落實孳生源清除，醫療院所加強疑似個案通報 (2018-08-10)

疾管署公布國內新增1例本土登革熱確定病例，為嘉義縣溪口鄉50多歲男性，近期無國外旅遊史，8月5日起陸續出現發燒、關節肌肉痠痛等症狀，於7日就醫後住院，經通報檢驗於8月9日確診感染登革病毒第一型。因應近年登革熱疫情威脅，疾管署自2015年起釋出登革熱病例群聚地圖 (<https://cdcdengue.azurewebsites.net/denguecluster.aspx>)，民眾可查詢本土登革熱病例地理分布，精確掌握住家附近疫情，同時里長也能運用於清除孳生源，強化社區動員。提醒民眾應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，並依法配合政府各項疫情調查與防治工作，以免受罰。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師及早診斷通報。

國內疫情

107/08/01~107/08/15

資料來源：衛生福利部疾病管制署

◎ 新增 2 例腸病毒重症病例，提醒家長落實勤洗手，勿輕忽嬰幼兒疑似腸病毒症狀 (2018-08-07)

今(2018)年累計 23 例腸病毒併發重症病例，其中 10 例為新生兒(含 7 例死亡)；重症確定病例感染型別多樣，其中 10 例感染伊科病毒 11 型，腸病毒 71 型 4 例，克沙奇 A4 型、克沙奇 B1 型各 2 例，克沙奇 A9 型、克沙奇 A16 型、克沙奇 B2 型、克沙奇 B3 型各 1 例，另有 1 例同時檢出克沙奇 A16 型及腸病毒 71 型。

腸病毒的傳染力極強，正確勤洗手是最有效的預防方法。成人感染腸病毒通常症狀較不明顯，容易因疏於防護而傳染給嬰幼兒，請民眾工作返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手；5 歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。其中新生兒可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒，初期會有發燒、活動力下降、喝奶量變少等情形，提醒民眾應留意新生兒的健康情形，特別是出生 7 天以內的新生兒，一旦有上述初期症狀，亦請務必儘速送醫治療。

◎ 預防登革熱有一套 - 防蚊措施、巡倒清刷不可少(2018-08-07)

國內今(2018)年截至 8 月 6 日共計 10 例本土登革熱病例，其中 9 例發生在北臺灣。北部過去較少發生本土登革熱疫情，以致民眾警覺性較低。北部登革熱病媒蚊為白線斑蚊，主要棲息於室外，且多在離孳生源不遠、陰涼不通風處活動，日出後 1 至 2 小時及日落前 2 至 3 小時為叮咬高峰。

提醒民眾從事戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用含 DEET 成分的防蚊液(乳)。另戶外活動時可使用 DEET 濃度 10% 至 30% 的防蚊藥劑，預防蚊蟲叮咬，另回到室內後要清洗乾淨；年齡兩個月以下的嬰兒，不適用含有 DEET 成份的防蚊藥劑，建議以外在遮蔽的方式(例如淺色長袖衣褲及蚊帳)防止蚊蟲叮咬。

提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除，若有大型廢棄容器如廢棄浴缸、水族箱等，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必每週檢查、刷洗並加蓋或加掛細網。呼籲民眾澈底清除孳生源是登革熱防治的根本，務必配合各項防治工作，主動清除居家內外的積水容器，才能有效阻斷疫情傳播；切勿拒絕、規避或妨礙主管機關之相關調查及處置，或製造髒亂孳生登革熱病媒蚊，以免受罰。