

高雄榮民總醫院臺南分院

流行性感感冒疫苗接種須知



一、流行性感感冒疫苗之安全性及副作用

1. 接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後 1~2 天內自然恢復。
2. 嚴重的副作用如立即型過敏反應，甚至過敏性休克（臨床表現包括呼吸困難、聲音沙啞、氣喘、眼睛或嘴唇腫脹、頭昏、心跳加速等）等不適情況極少發生，若不幸發生，通常於接種後幾分鐘至幾小時內即出現症狀。
3. 為了能在事件發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少 30 分鐘以上，待無不適後再離開。

二、流行性感感冒疫苗接種禁忌

1. 已知對蛋之蛋白質或疫苗成分過敏者，不予接種。
2. 年齡 6 個月以下，不予接種。
3. 過去注射流感疫苗曾發生嚴重不良反應者，不予接種。
4. 發燒或急性疾病，應延後接種。
5. 懷孕者是否接種由醫師評估。
6. 其他經醫師評估後不宜接種者，不予接種。

三、接種後注意事項

1. 為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位附近稍做休息，觀察 30 分鐘後再離開。
2. 使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少 2 分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
3. 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。
4. 完成疫苗接種後，雖可降低感染流感的機率，但仍有可能罹患流感，民眾還需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。
5. 接種流感疫苗後 48 小時內約有 1~2% 可能有發燒反應，應告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考。接種 48 小時後仍然持續發燒時，可能另有感染或其他發燒原因。

四、貼心提醒

1. 完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他非流感病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。
2. 世界衛生組織建議四價流感疫苗對於 B 型流感具有比三價疫苗更廣泛的保護力，以上若有疑問，請至家庭醫學科諮詢。



高雄榮民總醫院
臺南分院

K • V • G • H
Tainan Branch

關心您

護理部製作 M032