

# 高雄榮民總醫院臺南分院

## 引流管照護衛教



各位病友，在您住院或開刀期間，也許在您的身上會放置下列其中的一種引流管，為了讓你能了解其原因及接受它，順利的渡過這段住院的日子，而能早日的康復，故有以下幾點說明是需要您的合作與瞭解。

### 一、插引流管的目的：

1. 導尿管：將尿液引流出來，減除排尿困難引起的不適。
2. T形引流管：
  - (1) 引流膽汁，減輕黃疸。
  - (2) 便利於細小的石頭，隨膽汁排出。
3. 傷口引流管：將傷口部位的滲出液引流出來，避免傷口的發炎及促進癒合。
4. 鼻胃管：胃分泌液抽出或引流出，以減輕胃脹及幫助手術部位的癒合。
5. 胸腔引流管：則是引流胸腔內的氣體、積水/血，增進呼吸順暢。

### 二、您需要注意的事項：

1. 注意引流管的固定，避免拉扯及扭曲，影響引流液的通暢。
2. 請勿將管子自行移除。
3. 下床活動時，用安全別針將管子固定在衣服上。
4. 引流瓶(袋)勿提高超過傷口，避免引流液回流。
5. 引流瓶(袋)要放置妥當勿傾倒，若有引流瓶(袋)破損時，請先將引流管夾住，立即通知醫護人員。
6. 當引流液量少時，醫生會將你的引流管拔除，請勿著急。
7. 若有任何疑問，請與醫護人員溝通。

#### 四、若是您需要攜引流管回家時，則請注意下列的事項：

1. T形引流管若需要帶回家時，護理師會為你更換較小的引流袋。
2. 注意固定引流管，避免扭曲及牽扯。
3. 每天固定時間將引流液倒出，並記下顏色及總量。
4. 如果是負壓引流袋，在倒好引流液後，要把引流袋壓扁，才把塞子塞住，以利引流液流出。
5. 注意傷口周圍的變化，如有紅、腫、熱、痛、或發燒時，請立即就醫。
6. 暫勿沖澡，以擦澡方式清潔身體。
7. 當引流液有異常時如顏色改變，量忽然增加時，請隨時就醫。
8. 引流袋勿提高超過於傷口的高度。
9. 按照醫生約定的時間返院就診。



高雄榮民總醫院  
臺南分院 K·V·G·H  
Tainan Branch

關心您

護理部製作S017