

# 玻尿酸注射劑說明

簡介：

玻尿酸是一種暫時性皮內或皮下填充劑。目前國內核准上市的玻尿酸注射劑可分為細菌發酵

製成的玻尿酸及動物性玻尿酸，依據不同產品規格，可針對臉部肌膚紋路、皺紋及皺褶做修

飾，此外亦可運用於豐唇及臉部輪廓的修飾。因為注射部位及使用產品不同，個人體質也不

相同，因此注射後成效維持期長短也有差異。

適應症(僅列常用)：

凹疤、皺紋、臉部輪廓之修飾

注意事項：

1. 如有用阿斯匹靈或其他抗凝血劑，可能會增加注射部位瘀青及流血的風險，請告知你的醫師。
2. 注射後之傷口通常不須要特別照顧，但應避免在注射後當天做臉、敷臉等可能造成局部傷口感染之行為。
3. 於注射後約1-2天應盡量避免大力碰觸或按摩注射區域。此段時間可輕柔地使用水及肥皂清潔，同時輕微的卸妝是可被允許的。
4. 注射部位可能有輕微紅、腫脹、搔癢及注射部位有異常的觸感等，通常會在幾天後消失。如紅腫現象一直持續，則需要回診並進一步處理。
5. 豐唇治療後的腫脹情形會持續較久，可能長達一星期。
6. 為免玻尿酸被很快分解而失去療效，注射後請避免暴露在過熱過冷或是強熱光源的地方(如三溫暖、日光浴室、日光浴或極冷處)。

副作用及相對不適應症：

1. 孕婦、有感染性病灶之患者，治療前應由醫師評估。
2. 治療後可能會出現紫斑或瘀青現象，約2週左右會慢慢消退。
3. 注射部位可能有表面不平整現象，觸感異常，或是注入物產生位移的情形。
4. 注射部位的皮膚，可能因皮膚透光度改變而影響膚色。
5. 如有傷口感染或化膿，需接受抗生素治療。
6. 曾有臉部皰疹的患者，扎針處可能有引發皰疹發作的危險性。
7. 極少數患者可能出現過敏性肉芽腫。

臺灣皮膚科醫學會版權所有  
請參考本會網站「皮膚雷射治療守則」