

姓名： 出生日期： 病歷號：  
 性別： 就醫序號： 電話：  
 身分：  
 申請醫師： 申請科別： 申請時間：  
 檢查名稱： 申請序號

檢查地點：醫療大樓一樓 核醫科

排定檢查時間：

### 核醫造影檢查同意書

NMXXOTB1

病歷號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 性別：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_

因患\_\_\_\_\_須實施

檢查治療，經貴院\_\_\_\_\_醫師（醫師簽章）\_\_\_\_\_詳細說明該項檢查治療可能發生之併發症及危險，並  已充分瞭解，並已詳讀說明書/注意事項內容， 有疑問，進一步說明：\_\_\_\_\_  已了解同意由貴院施行該項檢查治療。貴院實施檢查治療時，應善盡醫療上必要之注意，檢查治療中或其後，若發生緊急情況，同意接受貴院必要之緊急處置。

此 致 高雄榮民總醫院

立同意書人：\_\_\_\_\_ 簽章 身分證統一編號：\_\_\_\_\_

住址/電話： 如右\_\_\_\_\_

( 請勾選 )  資料錯誤,重填: \_\_\_\_\_

陪同家屬(朋友)：\_\_\_\_\_, 與病患之關係： 配偶  父  母  子女  其他：\_\_\_\_\_

西元 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

附註：

- 一、立同意書人，由病人親自簽具；病人為未成年人或無法親自簽具者，依醫療法第六十四條第一項規定，得由其法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具。
- 二、立同意書人非病人本人者，『與病人之關係欄』應予填載與病人之關係。
- 三、醫院為病人實施手術後，如有再度實施手術之必要，除有醫療法第六十三條第一項但書所定情況緊急者外，仍應依本格式之程序說明並再簽具同意書，始得為之。本項檢查治療比照上述規定辦理。
- 四、醫療法第六十四條：「醫療機構實施中央主管機關規定之侵入性檢查或治療，應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人說明，並經其同意，簽具同意書後，始得為之。但情況緊急者，不在此限」。

## Osteomyelitis scan

**壹、一般注意事項：**

1. 請攜帶檢查申請單、檢查同意書，依排檢時間至醫療大樓一樓核醫科櫃檯報到。
2. 如需更改檢查日期或對說明書內容有疑慮時，請於檢查前一天(例假日除外)電話洽詢核醫科 07-3422121 分機 6402(更改排程)、6404(檢查說明)。
3. 本部的空調因需配合檢查機器正常運轉，所以溫度常年維持在 23-25°C 左右。體弱之受檢者請自備外套。
4. 因為注射之藥物含有少量放射性，有哺乳及懷孕可能之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及胎兒之安全。

**貳、特殊注意事項：**

1. 注射藥物後，若無其他需禁食之檢查，則可正常進食，並請盡量多喝水多排尿，以降低身體所接受之輻射劑量。
2. 大部分的藥物會經由尿液及糞便排出，因此如廁時請小心，勿將排泄物沾到衣褲或身體，若有沾污請立即清洗乾淨，以免影響影像的判讀。
3. 由於炎症檢查藥物會經由糞便排出，為使影像判讀不受腸道排泄影響，會視需要給予 2 顆緩瀉劑，此藥物有腹瀉、清腸的作用。請於**造影前一晚 (注射藥物當天)**飯後服用，並請配合食用稀飯、麵包、蔬菜水果等清淡食物，以利排便。若受檢者平時有服用軟便劑或緩瀉劑，則不需重複使用。
4. 本檢查需分日執行。懷疑有腹部疾患的受檢者，會視需要於隔天或另擇日期做追蹤造影。**有時最多會到七天。**

**參、其他說明：****一、檢查方式與範圍：**

1. Osteomyelitis scan (骨髓炎造影檢查)：早期骨關節感染及相關異常之偵測，以鑑別診斷骨髓炎及蜂窩性組織炎，評估感染治療效果。
2. 本檢查分成 3 個階段，在 2 天內進行：
  - (1) 第一階段：第一天在檢查台上由靜脈注射 鎳-99m 甲基雙磷酸鹽，並收集患部之血流相及全身血池相之影像。
  - (2) 第二階段：同一天約三小時後，收集全身骨骼之影像，完成後由靜脈注射鎳-67。
  - (3) 第三階段：另一天，收集全身炎症影像。
3. 受檢者在檢查檯上採取仰臥姿勢，進行全身掃描。每次照相時間長短和需要照相的張數，依據不同病情需求而有所不同(約 30-60 分鐘)。照相過程中要保持不動，才能提供清晰的影像，讓醫生做出正確的診斷；若影像因而不清楚，可能需要重新檢查。
4. **每個階段會向您約定下個階段的時間。**
5. 鎳-67 會由糞便與小便排出身體，若有部分殘留在腸道，可能會影響腹部、背部的判讀。可能視情況在於隔天或另擇日期再請您來收集一次延遲的影像。

**二、檢查後可能出現的暫時症狀：**

服用緩瀉劑(Dulcolax)可能會有腹部絞痛、腹瀉等感覺。如有上述症狀發生時不需緊張，一般於 2-3 天內會自動緩解。

**三、藥物注射後可能出現的副作用：**

對特殊體質者暫時可能出現紅疹、畏寒、噁心、嘔吐、氣喘及暈眩等症狀，其發生率小於十萬分之六。

**四、其他可能的替代方式(請與您的臨床醫師討論)。**

**我已詳細閱讀、了解本檢查說明書，並完成簽署同意書**