健康管理中心

● **學經歷** ● 高雄醫學大學醫學後醫學系
高雄榮總健康管理中心主治醫師
高雄榮總家庭醫學部總醫師
高雄榮總家庭醫學部住院醫師

● **專長** ● 家庭醫學、預防醫學、戒菸、安寧緩和療護

主治醫師 吳品潔

銀髮族的隱形殺手 骨質疏鬆

人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，隨著年齡的增加，之後骨量會逐漸減少，骨質疏鬆即表示骨頭呈現中空易脆的情況，讓骨折的機率大為提高。骨質疏鬆是許多停經後婦女及老年人面臨的問題，已成為全球第二大的重要流行病。由國民營養健康狀況變遷調查報告(2004-2008)可知，國內50歲以上在腰椎、股骨頸和前臂至少有一部位符合骨質疏鬆症診斷，男性盛行率為22.57%、女性盛行率達41.17%，骨質疏鬆的預防與篩檢已是重要的議題。

在社區或企業大量篩檢時，常用的儀器是足跟定量超音波(QUS)，然而此儀器之診斷標準尚未建立共識，且介入治療的時機也未有一致性的看法，只宜做為骨鬆性骨折風險的初步篩檢工具。診斷骨質疏鬆的標準儀器是中軸型的雙能量X光吸收儀(dual-energy X-ray absorptiometry, DXA)，同時測量腰椎及髖骨，本院便是使用此種儀器測量上述兩個部位。若民眾遇到QUS與DXA的數值不一致，則以DXA資料為主。

預防骨質疏鬆，應從年輕時開始「儲存骨本」。可從下列幾個方面著手。於生活習慣上，建議戒菸、戒酒和減少攝取含咖啡因飲品。於日常飲食中增加鈣和維生素D的攝取、適度曬太陽，規律運動。

★鈣質攝取建議量為每日1000~1200毫克，高鈣食物如：牛乳、優格、起司、小魚

乾、米、吻仔魚、黑芝麻、豆腐等

★維生素D攝取量建議量每日600-800IU，維生素D的主要功能包括促進鈣吸收，維護正常骨代謝，肌肉功能，富含維生素D的食物如：沙丁魚、鮭魚、鯖魚、蛋黃等。適當的陽光照射也是增加體內維他命D的方式，選擇陽光不是最強烈的階段(上午10點以前或下午2點以後)不使用防曬用品(例如：帽子、衣物、防曬乳等)，日曬約10~20分鐘。

★運動可增加骨密度、增強肌力、改善平衡功能。負重型運動：包括健走、慢跑、和爬樓梯等；阻抗型運動：藉由健身器材或其他重物的阻力，來訓練肌肉與骨骼的強度；柔軟度運動：規律的拉筋伸展可預防運動傷害。三種可交替執行。

防治骨質疏鬆症之最終目的為減少骨折，降低骨折相關併發症的產生，因此預防跌倒也十分重要的，包含浴室使用止滑墊、夜間開夜燈、樓梯設置扶手或欄杆等。

高雄榮總健康管理中心骨質密度檢查是採用標準的中軸型的雙能量X光吸收儀，同時測量腰椎及雙側髖骨的骨質密度，讓民眾能清楚地得知自己目前骨質密度的狀態。我們目前亦提供骨質疏鬆患者照護服務，歡迎有需要的民眾可至本院健康管理中心詢問。