

NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SỐT SAU KHI TỪ BỆNH VIỆN VỀ NHÀ (發燒病人返家後應注意事項 越南文)

- ◆ Phương pháp chữa trị sốt
 1. Nhiệt độ nách trong khoảng 38°C : Uống nhiều nước, nghỉ ngơi, sử dụng gói lạnh.
 2. Nhiệt độ nách từ 38⁰C - 39°C : Uống thuốc hạ sốt theo đơn của thầy thuốc, sử dụng gói lạnh, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều.
 3. Nhiệt độ nách từ 39°C trở lên: sử dụng viên nhét hậu môn do bác sĩ chỉ định, lau nước ấm, sử dụng gói lạnh, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều.
- ◆ Khi người bệnh sốt, người nhà không nên nóng vội mà cần cho uống thuốc hạ sốt theo đơn của thầy thuốc.
- ◆ Ít nhất cứ sau 4 giờ phải cặp nhiệt độ một lần.
- ◆ Khi sử dụng viên nhét hậu môn cần sử dụng cách nhau ít nhất từ 4-6 tiếng, để đề phòng lượng thuốc quá nhiều gây ra chứng thể nhiệt thấp.
- ◆ Khi phát sốt cần cởi bớt quần áo và chăn đắp, bảo đảm không khí lưu thông để hạ nhiệt.
- ◆ Lượng nước phải đủ để cơ thể toả nhiệt qua mồ hôi hoặc nước tiểu.
- ◆ Cố gắng tránh ra vào nơi đông người.
- ◆ Uống thuốc đúng giờ theo lời dặn của thầy thuốc.
- ◆ Chẩn đoán nhanh chỉ có thể đưa ra các biện pháp xử lý tức thời, sau đó cần phải đến các cơ sở y tế để tiếp tục khám lại, tránh tình trạng gộp chứng bệnh.

Nếu bạn đã hiểu về các nội dung những điểm cần chú ý
đối với bệnh nhân sốt sau khi về nhà thì xin mời ký tên.
Người bệnh hoặc người nhà ký tên _____ ngày _____

Giấy ghi thông tin bệnh nhân



高雄市立聯合醫院
Bệnh viện liên hợp thành phố Cao Hùng
P8800193 97.12.2000 張 21x29.7cm