

包皮手術後照顧需知

- ◆因局部麻醉會有血腫或腫脹情形，是暫時性的，會逐漸消退毋須擔心。
- ◆如有下列情形請回院就醫：
 1. 傷口出血不止。
 2. 超過6小時以上沒排尿。
 3. 發燒或傷口有明顯紅腫熱痛情形。
 4. 包皮套三星期以上仍未脫落。
 5. 傷口非常疼痛。
- ◆小孩實行包皮環手術，有可能因傷口疼痛不敢小便，儘量鼓勵不要責罰，穿寬鬆褲子，保持傷口乾淨。
- ◆手術當天以擦澡即可，傷口不要碰濕，一週內避免傷口碰撞或激烈運動（如：騎機車、拿重物）。
- ◆六週內避免性行為、自慰。
- ◆每次小便完及洗澡後，用消毒棉花棒擦乾傷口後再塗抹藥膏於傷口處。
- ◆包皮套約在二星期後連線一起脫落，毋須拆線，包皮套未完全脫落時，毋用力拉扯。
- ◆手術後回診日期：_____

如您對包皮手術後照顧需知
內容瞭解請簽名

病人或家屬簽章_____日期_____



高雄市立聯合醫院

Kaohsiung Municipal United Hospital

P8800164 106.4. 本(100張/本)15x21cm